

Vaccination Covid-19 :

Principales caractéristiques des vaccins et administration en Belgique

PFIZER

- ARNm
- À partir de **12 ans** (Signature des parents si entre 12 et 15 ans. Nécessité d'informer).
- En particulier pour toutes les femmes enceintes, à tout âge de la grossesse (de préférence avant 32 semaines).
- 2 injections à **35 jours** d'intervalle (entre **21 et 42 jours** en Wallonie).
- Effets secondaires fréquents : douleur locale, état grippal, troubles digestifs.
- Effets secondaires (très) rares : coagulopathie, thrombopénie.

JOHNSON & JOHNSON

- Vaccin à vecteur viral non répliquatif.
- À partir de **41 ans**
- À Bruxelles: entre 18 et 41 ans sur base volontaire (+ consentement éclairé).
- **1 seule injection**
- Effets secondaires fréquents : douleur locale, état grippal, troubles digestifs.
- Effets secondaires (très) rares : thrombose et thrombopénie auto-immune.

MODERNA

- ARNm
- À partir de **18 ans**
- En particulier pour toutes les femmes enceintes, à tout âge de la grossesse (de préférence avant 32 semaines pour conférer une protection utile avant le terme).
- 2 injections à **28 jours** d'intervalle
- Effets secondaires fréquents : douleur locale, état grippal, troubles digestifs.
- Effets secondaires (très) rares : coagulopathie, thrombopénie.

ASTRAZENECA

- Vaccin à vecteur viral non répliquatif.
- À partir de **41 ans**. Entre 18 et 41 ans pour la 2ème dose. Sauf femmes enceintes (2ème dose ARNm).
- À Bruxelles : entre 18 et 41 ans pour une 1ère dose, sur base volontaire (+ consentement éclairé).
- 2 injections à **8 à 12 semaines**.
- Effets secondaires fréquents : douleur locale, état grippal, troubles digestifs.
- Effets secondaires (très) rares : thrombose et thrombopénie auto-immune.