



Covid-19 : Testing et quarantaine

TESTING

TESTING GÉNÉRAL

Il faut tester les publics suivants :

1. **Patients qui répondent à la définition de cas** : sauf les enfants de moins de 6 ans. (! [Indications différentes dans les écoles](#))
2. **Contacts à haut risque symptomatiques et voyageurs entrants.**

SI VACCINÉ, LE PATIENT DOIT

1. **SE FAIRE TESTER** : s'il présente des symptômes possibles de Covid-19
2. **NE PAS ÊTRE TESTÉ** : s'il est contact à haut risque sans symptôme, lors d'un dépistage dans d'autres contextes.

À SAVOIR

Vacciné =

- A reçu sa **dose booster**
- Dernière **dose de vaccination de base <5 mois**
- Certificat de **rétablissement <5 mois**
- **Jeunes (12-17)** avec vaccination de base

Partiellement vacciné =

- Dernière **dose de vaccination de base >5 mois**

Mesures préventives strictes =

Masque buccal (FFP2), distances, pas de contacts avec les personnes vulnérables, etc.

QUARANTAINE

Pour les contacts à haut risque.

VACCINÉS

- Quarantaine
- **Mesures préventives strictes pendant 10 JOURS**

PARTIELLEMENT VACCINÉS

- **Quarantaine 7 JOURS** (fin à partir de **J4**, si autotest négatif quotidien)
- **Mesures préventives strictes pendant 10 JOURS.**

NON VACCINÉS

- **Quarantaine 10 JOURS** (fin à partir de **J7**, si auto test négatif quotidien)
- **Mesures préventives strictes pendant 10 JOURS.**
- Enfants (5-11) = **statut de l'adulte avec lequel il vit** (mêmes règles de quarantaine).

ISOLEMENT

Les personnes présentant des symptômes ou étant identifiées comme infectées sur la base d'un test positif (PCR ou antigénique). Aucune distinction entre les personnes entièrement vaccinées, partiellement vaccinées et non vaccinées.

AMBULATOIRE À DOMICILE

- **10 JOURS** après l'apparition des symptômes ou à partir du test positif.
- **7 JOURS** si **asymptomatique** ou **plaintes légères** (+ **3 JOURS** avec protections supplémentaires et port du masque (FFP2) permanent).
- Présenter au moins **3 JOURS SANS FIÈVRE** et amélioration clinique.

HOSPITALISÉS

- **14 JOURS** après l'apparition des symptômes ou à partir du test positif.
- **21 JOURS** pour les personnes immunodéprimées

COLLECTIVITÉS

- Isolement de **14 JOURS** après l'apparition des symptômes ou à partir du test positif.
- **10 JOURS** si **asymptomatique** ou **plaintes légères**
- Présenter au moins **3 JOURS SANS FIÈVRE** et amélioration clinique.
- Si personnel soignant collectivité : **7 JOURS** + port du masque FFP2 sur le lieu de travail.

Où se faire tester ?

Centres de testing

[Voir la carte](#)

Pharmacies

[Voir la carte](#)

Outil d'auto-évaluation

Pour recevoir un code de test avec lequel se rendre en centre de testing ou à la pharmacie. [Vers le self assessment testing.](#)

Certificat de quarantaine

[À demander ici](#)

Avec le soutien de :