Fiche pratique

La vaccination RSV

Début de la vaccination : Septembre/Octobre
Pic épidémique : Automne/hiver
Co-administration avec le vaccin grippe, Covid ou pneumocoque : possible

Arexvy® (Bf) : 12,50 €/8,30€ BIM
Abrysvo® (Bf) : 12,50 €/8,30€ BIM (uniquement pour les femmes enceintes)

L'accord du médecin conseil peut être obtenu de manière électronique via le DMI.

Groupes cibles

- >65 ans institutionnalisés
- >65 ans avec facteur de risque
  - Diabète
  - Maladie respiratoire chronique
  - Insuffisance cardiaque chronique
  - Insuffisance rénale chronique
  - Obésite (BMI>30)
  - Immunodéficience à cause de maladie/traitement

Vaccins

Arexvy® → Remboursement pour les >65 ans si institutionnalisés OU à risque accru de maladie sévère.
Abrysvo® → seul prescrit en cas de grossesse

Nourrissons

Le Beyfortus® est recommandé pour tous les nourrissons au cours de leur première saison de VRS (si la mère n'a pas été vaccinée par Abrysvo pendant la grossesse) :

- < 5 kg : 50 mg par voie intramusculaire ;
- ≥ 5 kg : 100 mg par voie intramusculaire

Bébés nés entre 16/03/26 et le 30/09/26 : injection entre 01/09/26 et 31/10/26.

Bébés nés à partir du 01/10/26 : traités à la maternité, sinon peuvent le recevoir au cours de la saison VRS.

L'administration de Nirsévimab® (anticorps monoclonaux) est également disponible pour le jeune nourrisson.

Femmes enceintes

- Vaccin = Abrysvo®
- Entre la 24e et 36e semaine de grossesse. → Protection passive du nourrisson jusqu'à 6 mois.
- Si naissance plus de 15 jours après injection, Beyfortus ni nécessaire ni remboursé.

- Vaccination contre la grippe peut être programmée en même temps, mais un délai d'au moins 14 jours sera respecté après la vaccination contre la coqueluche.
- Pas en même temps que le DTPa (au moins 15 jours d'intervalle).

Sources :
Courrier de l'Aviq, CSS, SSMG, INAMI, Promosanté, CBIP (groupes cibles), ONE