La vaccination automne/hiver 26

Fiche pratique

Groupes cibles	Covid-19	Grippe	RSV	Pneumocoque
>75 ans	V	V	V	V
>65 ans	V	V		V
>65 ans instutionnalisé ou avec facteurs de risque			V	
>50 ans avec comorbidités	V	V		V
50-65 ans avec consommation excessive d'alcool, inactivité physique ou fumeur	A	A		
≥ 18 ans avec au moins une comorbidité	V	V		V
≥ 18 ans immunodéprimé	V	V	V	V
≥ 18 ans avec risques accrus (fuite de LCR, implant cochléaire, greffés/candidats, asplénie)				V
>6 mois avec affection chronique sous-jacente		V		
Enfants (6 mois - 18 ans) immunodéprimés ou atteints de maladies chroniques sévères		V		
Enfants (6 mois - 18 ans) sous aspirine à long terme		V		
Nourrissons			2	
Personne vivant en institution	V	V	V	
Femme enceinte	1	V	3	
Personne avec obésité	V	V	V	
Personne travaillant dans le secteur de la santé	V	V		
Personnes sous le même toit que :				
◦ Patient gravement ou très gravement immunodéprimé	V	V		
◦ personnes du groupe 1 de la grippe		V		
◦ enfants de moins de 6 mois sans facteur de risque dont la mère n'a pas été vaccinée contre la grippe pendant la grossesse		V		
éleveurs de volailles ou porcs, ou personnes vivant sous le même toit		V		
professionnels en contact avec volailles ou porcs vivants par leur travail		V		

V - Vacciner
A - Attention particulière
1 - Si comorbidités OU grossesse à haut risque OU jamais été ni infectée ni vaccinée contre le COVID-19.
2 - Beyfortus, Nirsévimab ou vaccination maternelle. Voir fiche pratique Vaccination VRS
3 - Conditions spéciales. Voir fiche pratique Vaccination VRS

Source : CSS